

# Centro Médico

Tradición en la Escuela de Medicina de Virginia

## Preparación para la Cirugía de la Bóveda Craneana

Esté en el Hospital 2 horas antes la Cirugía

### Comida antes de la Cirugía

- Su hijo puede comer o tomar su biberón hasta 6 horas antes de la Cirugía. Esto significa que si la Cirugía está planeada para las 7:30 AM, la última comida debe finalizarse a las 1:30AM.
  - Le puede dar a su hijo líquidos claros o leche materna hasta 3 horas antes de la Cirugía.
- Ejemplos de líquidos claros son los jugos de manzana, Pedialyte y agua.

### ¿Qué traer al Hospital?

- Vista una ropa confortable y deje en casa cualquier objeto de valor.
- Se necesita una identificación con foto.
- Sábanas favoritas, animales de peluches, juguetes, discos compactos de música, le ayudarán a confortar a su hijo, tenemos a su disposición reproductores de disco compacto.
- Si su bebé usa biberones o chupones especiales, tráigalos consigo.
- Usted no necesita traer pañales desechables o fórmula.

### ¿Dónde estacionar su vehículo?

- La opción más fácil y cercana es la del servicio de valet parking - \$5 por día.
- Si no le preocupa caminar un poquito, usted puede estacionar su vehículo por sí mismo en el área de Visitantes a un costo de \$2 por día. (No olvide validar su ticket de estacionar en el mostrador de información en el edificio que dice Gateway Building o Ambulatory Care Center.

## **Preparación para la Cirugía**

- Se vestirá a su hijo con una bata del hospital.
- Se llenarán los últimos documentos.
- Usted hablará con el Anestesiólogo de pediatría. Este será el doctor que le suministrará a su hijo el medicamento que lo pondrá a dormir antes de la cirugía y que lo protegerá y lo mantendrá cómodo durante la operación.
- No se le provocará ningún dolor a su hijo mientras esté despierto. Se le suministrará a través de una máscara el medicamento que lo dormirá. Cuando esté dormido se le pondrán los tubos y dispositivos intravenosos (IV) que necesita su hijo para su protección. Este proceso puede durar una hora.

## **Durante la cirugía de su hijo**

- Se le va a dar un localizador (busca personas)- Usted no tiene que estar sentado en la sala de espera. Desayune o pasee alrededor del Hospital.
- La enfermera de la sala de operaciones le va a llamar para avisarle cuándo empieza la operación. A Usted se le actualizará cada hora.
- La Dr. Rhodes le hablará a Usted cuando su hijo esté seguro en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría.
- Usted estará con su hijo lo antes posible.

## **¿Qué esperar después de una Cirugía de la Bóveda Craneana?**

### **En el Hospital**

- Puede que al despertarse su hijo esté inquieto, molesto o esté llorando, eso es normal.
- Se le suministrará a su hijo medicamentos para asegurarnos que él o ella esté en calma y cómodo.
- En el dedo de la mano o del pié de su hijo va a haber una pegatina con un bombillito rojo. Se le llama oxímetro de pulso. Es para asegurarnos de que su hijo esté recibiendo suficiente oxígeno.
- Su hijo va a recibir suero (IV) después de la cirugía. Aunque su hijo no beba lo mucho, a ella o él se le va hidratar bien.
- Su hijo va a permanecer como mínimo una noche en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría y mínimo 2 días en el Hospital.

- Todos los niños quedan inflamados después de la operación. Estarán más inflamados hasta después de las 48 horas de la operación.

### **Después de la Cirugía**

- Su hijo por unos días puede que no coma o beba tanto como acostumbraba.
- Se le permitirá comer y beber de la misma manera que antes de la cirugía. Biberones, vasitos con tapa, pajillas y cucharas estarán bien.
- El Dr. Rhodes no recomienda férulas (“no-nos”) o cualquier otro aditamento que restrinja las manos.
- Todos los puntos se disuelven por sí mismo. Esto podría tomar varias semanas.
  - Usted no debe hacer nada especial en la incisión. Debe lavarle la cabeza a su hijo un día sí, otro no, con champú de bebé.
- Está bien que use el chupete.
- La inflamación irá bajando poco a poco. Usualmente puede desaparecer en 10 días.

### **Regresando a la normalidad**

- Asegúrese de tener en su casa Tylenol infantil, Ibuprofeno para niños.
- Si tiene costras nasales use hisopos con suficiente agua salina para ayudar a limpiar el orificio nasal.
- El Dr. Rhodes recomienda durante 5 días el Tylenol y el Ibuprofeno Infantil, alternándolos cada vez, mientras el niño esté despierto.
- Algunos niños tienen problemas para dormir en la noche después de la cirugía. Por los primeros días dele mucho amor y comprensión a su hijo. Después de una semana muchos padres tratan de restablecer la rutina anterior a la cirugía.

Jennifer L. Rhodes, M.D.  
Ruth Trivelpiece, M.Ed